



Pyrazinamide (PZA)

Guía del paciente para tomar medicamento contra la TB

¿Qué es Pyrazinamide?

Pyrazinamide (PZA por sus iniciales en inglés) es un medicamento antibiótico utilizado para tratar la tuberculosis (TB por sus iniciales en inglés). Hay dos maneras de utilizarlo:

1. Para tratar infección de TB.
2. Para curar la enfermedad de TB (cuando se toma con otros medicamentos).

Los gérmenes de TB son muy fuertes y son difíciles de matar. Usted tendrá que tomar este medicamento por 2 meses o más a fin de matar la bacteria. Su médico decidirá exactamente cuántos meses tomará la medicina.

¿Cómo tomo este medicamento?

- Es muy importante que usted tome el medicamento cada día o según le indique su médico.
- Informe a su médico inmediatamente si deja de tomar la medicina.
- Si usted falla una dosis, tómela cuanto antes, pero nunca tome dos dosis al mismo tiempo.
- Intente tomarse el medicamento con el estómago vacío. Si le cae mal al estómago, tómese con comida.
- Recuerde informar a su médico acerca de otros medicamentos que esté tomando o cualquier nuevo medicamento que empiece a tomar
- Si está embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de tomar este medicamento
- Almacene PZA en un lugar fresco y seco.

NO beba alcohol mientras esté tomando este medicamento. Puede dañar su hígado.

La mayoría de las personas toman este medicamento sólo por los primeros dos meses de tratamiento. Durante este tiempo puede ser necesario ser tomado una, dos, o tres veces por día dependiendo de lo que prescriba el médico.

¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios a los que debo estar atento?

- La mayoría de las personas no tienen problemas mientras están tomando PZA
- Usted tendrá que ser monitoreado regularmente por su médico mientras está tomando PZA

Algunos efectos secundarios comunes son:

- Malestar estomacal/pérdida de apetito
- Inflamación o dolor en las articulaciones
- Sarpullido cutáneo
- Mayor sensibilidad al sol
- **Si tiene alguno de los siguientes efectos secundarios más graves, deje de tomar el medicamento y llame a su médico**
- Fatiga/cansancio
- Náusea/vomito
- Calambres estomacales
- Pérdida de apetito
- Piel u ojos amarillentos
- Orina muy oscura
- Fiebre durante 3 días o más

Consejos para tomar medicamentos contra la TB

- Tome su medicamento al mismo tiempo cada día, por ejemplo:
 - Antes de ir a la cama
 - Primera cosa por la mañana
- Use un contenedor de píldoras semanal
- Marque cada día que se tome las píldoras en un calendario
- Pídale a un familiar o un amigo que se lo recuerde
- Considere la Terapia de Observación Directa (DOT por sus iniciales en español)

Adaptado y Reimpreso Con El Permiso de Salud Pública de Toronto